




« ... Avec l'aide d'autres familles touchées par le SEIPA, nous faisons face, nous gérons la situation et nous devenons des familles encore plus fortes à cause de ce syndrome »
- Une maman

Le SEIPA (syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires) est un type d'allergie alimentaire rare affectant l'appareil digestif. Les symptômes classiques du SEIPA apparaissent au moins deux heures après l'ingestion d'un aliment « déclencheur », ils se traduisent y piquement par des vomissements intenses, une diarrhée et peuvent progresser vers un choc.




Il n'existe pas de traitement curatif pour le SEIPA et pas de test diagnostique permettant de confirmer le diagnostic. Les épreuves alimentaires sont la seule façon de déterminer si un aliment est sûr ou non pour chaque enfant. N'importe quel aliment peut déclencher un SEIPA et des enfants réagiront à des aliments différents.

Le SEIPA est mal connu, même au sein du monde médical, et une prise de conscience est absolument nécessaire pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des symptômes chez les enfants atteints. Ensemble, nous pouvons favoriser cette prise de conscience et contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants atteints et de leur famille.

La Fondation FPIES est une organisation à but non lucratif 501(c3) dont la mission est de surmonter les difficultés que pose le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires, en offrant des outils éducatifs, un soutien, en menant des actions permettant d'aider les familles et le monde médical.

www.TheFPIESFoundation.org



Quel est le SEIPA ?

Le SEIPA (syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires) est un type d'allergie alimentaire affectant l'appareil digestif.

Symptômes:

- Le tableau classique d'un SEIPA après l'ingestion d'un aliment déclencheur se manifeste par l'apparition retardée de symptômes graves (après deux ou trois heures ou plus), notamment des vomissements intenses et répétés et une diarrhée pouvant éventuellement déclencher un choc pseudoseptique.
- Le tableau chronique comprend des vomissements de plus en plus graves, une diarrhée et une croissance insuffisante pouvant éventuellement évoluer en une maladie ressemblant à une grave infection généralisée de l'organisme.

Facteurs déclenchants :

- Dans les premiers mois de vie, les symptômes de SEIPA sont le plus souvent provoqués par des préparations à base de protéines de lait de vache et parfois par le soja; les protéines du lait maternel peuvent aussi provoquer des symptômes chez certains enfants.
- Chez les enfants présentant un SEIPA dû à des aliments solides, le riz et l'avoine sont les facteurs déclenchants les plus fréquents. N'importe quelle protéine alimentaire peut déclencher une réaction, certains enfants peuvent réagir à un ou deux aliments, alors que d'autres peuvent présenter des réactions à de multiples aliments.

Tests:

- Le SEIPA n'est pas une allergie alimentaire assurée par la médiation des IgE. Contrairement à des allergies alimentaires typiques, les symptômes peuvent ne pas être immédiats et ne comprennent pas d'urticaire, d'œdème ou de respiration sifflante et ils ne sont pas détectés avec les tests allergiques standard.
- Un diagnostic de SEIPA est généralement établi par un allergologue ou un gastro-entérologue qui prend en compte les antécédents médicaux du patient et exclut de nombreuses autres maladies possibles.

Traitement:

- Les symptômes de SEIPA sont graves. Des soins médicaux immédiats sont nécessaires, notamment une réhydratation par voie intraveineuse et une surveillance.
- Avec des soins médicaux appropriés et à un régime alimentaire personnalisé permettant d'assurer une alimentation correcte, les enfants atteints de SEIPA peuvent grandir et se développer.



www.TheFPIESFoundation.org